

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Atezolizumab - Bevacizumab

Schema

- Atezolizumab 1200 mg IV d1 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Bevacizumab 15 mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Eerste toediening over 90min, tweede toediening over 60 minuten, nadien over 30 minuten indien goed verdragen
- q3w

Opmerkingen

- Immunotherapie startbilan te doen voor start
- Bevacizumab
 - Als bevacizumab wordt gestaakt, overweeg om atezolizumab als monotherapie te continueren met alternatieve dosering van 1680mg IV q4w
 - Te pauzeren bij heelkunde
 - Stop 4-6 weken voor majeure chirurgie
 - Stop 1 week voor kleinere heelkunde
 - Elke keer via dipstick proteïnurie controleren
 - Bloeddrukdagboek bij te houden
 - Contra-indicaties: arteriële tromboses

Nevenwerkingen

- Infuus gerelateerde nevenwerkingen
- Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))
- Hypertensie, proteïnurie, vertraagde wondheling
- Arteriële thrombose (zeker bij patiënten > 65j met voorgeschiedenis van arteriële thrombose)
- Bloeding, fistulisatie, perforatie
- Zeldzaam: Episode van reversibel posterior leukoencefalopathiesyndroom (RPLS)