

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

# Capecitabine – Temozolomide (CAPTEM)

### Schema

- Capecitabine 750 mg/m<sup>2</sup> PO 2x/d gedurende 2 weken, gevolgd door **2 weken** rust
- Temozolomide 200 mg/m<sup>2</sup>/dag PO D10 – D14 (nuchter 1u voor maaltijd) (alternatief: 100 mg/m<sup>2</sup> 2/d)
- Q4w
- Supportieve medicatie
  - Zofran 8mg po D10 – D14
  - (evt olanzapine 5 mg d1-4)

### Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Capecitabine 30 minuten na de maaltijd, interval van 12u tussen twee dosissen
- Capecitabine is beschikbaar als tabletten van 150 mg en 500 mg
- Temodal is beschikbaar als tabletten van 5 mg, 20 mg, 100mg, 140mg, 180 mg en 250 mg
- Zonnecrème aanraden

### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Handvoetsyndroom (preventie met hydraterende crème, pedicure en vermijden van compressie)
- Cardiotoxiciteit (coronaire spasmen)

### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
  - eGFR 30-50: reduceer capecitabine met 25%
  - eGFR < 30: STOP chemotherapie