

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Carboplatin – Paclitaxel – (Radiotherapie)

Schema

- Cross schema (met RT)
 - Paclitaxel 50mg/m² IV (in 250mL NaCl 0.9% over 1 uur)
 - Carboplatin AUC 2 IV (in 250mL glucose 5% over 1uur)
 - 5x q1w samen met radiotherapie
- Standaard zonder RT Q3W
 - Paclitaxel 175 mg/m² IV D1 (over 3u)
 - Carboplatin AUC 5 IV D1 (over 1u)
- Supportieve medicatie
 - Wekelijks schema: Dexamethasone 10 mg IV 1u voor paclitaxel
 - 3wekelijks schema: Dexamethasone 20 mg IV 1u voor paclitaxel
 - Cetirizine 10mg PO ochtend van paclitaxel
 - Akynzeo d1 PO (1u voor chemo)

Opmerkingen

- Streefwaarde Hb 10g/dL gezien radiotherapie

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nagel toxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bili 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bili 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bili >5: geen paclitaxel.