

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

### FLOT

#### Schema

- Levofolinezuur 200 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 2u in 100mL glucose 5% - samen met oxaliplatin)
- Oxaliplatin 85 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 2u in 250mL glucose 5%)
- 5FU infusor 2600 mg/m<sup>2</sup> IV voor 24u (120mL NaCl 0.9%)
- Docetaxel 50 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 1u in 250mL NaCl 0.9%)
- q2w
- Supportieve medicatie
  - Dexamethasone 20 mg IV bolus D1 (1u voor chemo), dexta 8 mg PO d2,d3
  - Aloxi 250 µg D1
  - Pegfilgrastim 6mg SC (24u na einde chemo)

#### Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Ijshandschoenen tijdens toediening docetaxel
- Contact met koude vermijden gedurende eerste 3 dagen

#### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Vermoeidheid, vochtretentie, tranende ogen, nageltoxiciteit
- Haarverlies
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurologisch: neuropathie, laryngopharyngeale dysesthesie
- Cardiovasculair: coronaire spasmen (5FU-gerelateerd)

#### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
  - Klaring 30 – 49: 25% reductie oxaliplatin
- Beperking leverfunctie: best geen docetaxel gebruiken bij verhoogd bilirubine
- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 - 6