

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Paclitaxel +/- Ramucirumab

Schema

- Paclitaxel 80 mg/m² IV d1 - d8 - d15 (infusie over 60 min in 250mL NaCl 0.9)
- Ramucirumab 8 mg/kg IV d1 - d15 (infusie over 60 min in 250 mL NaCl 0.9%)
- q4w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10 mg IV dag 1 (1u voor chemo), d8, d15
 - Cetirizine 10 mg PO d1 + d8 + d15.

Opmerkingen

- Indien paclitaxel Q3w: 175 mg/m² over 3u
- Ramucirumab geeft vertraagde wondheling
 - Stop 4-6w voor majeure chirurgie
 - Stop 1w voor kleinere chirurgie (vb. PAC plaatsing)

Nevenwerkingen

- Paclitaxel gerelateerde nevenwerkingen:
 - Gastrointestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust, mucositis, diarree
 - Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
 - Neurotoxiciteit, vloeistofretentie, vermoeidheid, tranende ogen, nageltoxiciteit
 - Haarverlies
 - Hoofdpijn, spierpijn
- Ramucirumab gerelateerde bijwerkingen:
 - Hypertensie, proteinurie, vertraagde wondheling
 - Arteriële thrombose, bloeding

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bili 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bili 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bili >5: geen paclitaxel.