

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

### Tomudex – Oxaliplatin

#### Schema

- Tomudex (ralitrexed) 2,4 - 3 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infuus over 15 min in NaCl 0,9%) Q3W
- Oxaliplatin 100 - 130 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 2u in 500mL glucose 5%)
- Q3w
- Supportieve medicatie
  - Aloxi (palonosetron) 250 µg IV 30 min voor chemo
  - Dexamethasone 10 mg IV 30 min voor chemo, dexta 8 mg po D2 en D3

#### Opmerkingen

- Contact met koude vermijden gedurende eerste 3 dagen

#### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Neurologisch: neuropathie, laryngopharyngeale dysesthesie

#### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
  - eGFR 30-49: reduceer oxaliplatin met 25%
  - eGFR < 30: STOP chemotherapie
  - Tomodex:
    - Klaring > 65: 100%
    - Klaring 55 - 65: 75% Q4w
    - Klaring 25 -54: 50% Q4w
- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 - 6h