

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

mFOLFIRI

Schema

- 5FU bolus 400 mg/m² IV d1 (infusie over 10 minuten in 50mL NaCl 0.9%)
- 5FU infusor 2400 mg/m² IV voor 46u
- Levofolinezuur 200 mg/m² IV d1 (infusie over 90 min in 100mL glucose 5% - simultaan met irinotecan)
- Irinotecan 180 mg/m² IV d1 (infusie over 90 min in 250mL glucose 5%)
- q2w
- Supportieve medicatie
 - Atropine 0.25 mg SC (10 min voor toediening irinotecan) ter preventie van acuut cholinerg syndroom
 - Aloxi 250 µg IV 30 min voor chemotherapie
 - Dexamethasone 10 mg IV D1, 8mg PO op d2 en d3

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haarverlies
- Cardiovasculair: coronaire spasmen (5FU)

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
 - Ernstig (bilirubine > 3 mg/dL): STOP irinotexan