

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

### mFOLFOX

#### Schema

- 5FU bolus 400 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 10 minuten in 50mL NaCl 0.9%)
- 5FU infusor 2400 mg/m<sup>2</sup> IV voor 48u (120 mL NaCl 0.9%)
- Folinezuur 200 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 2u in 100mL glucose 5% - simultaan met oxaliplatin)
- Oxaliplatin 85 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 2u in 250mL glucose 5%)
- q2w
- Supportieve medicatie
  - Aloxi 250 µg IV 30 min voor chemotherapie
  - Dexamethasone 10 mg IV D1, 8mg PO op d2 en d3

#### Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Contact met koude vermijden de eerste 3 dagen

#### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies
- Neurologisch: neuropathie, laryngopharyngeale dysesthesie
- Cardiovasculair: coronaire spasmen (5FU)

#### Dosisaanpassingen

- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 - 6h
- Beperking nierfunctie
  - Klaring 30 – 49: 25% reductie oxaliplatin