

## DERMATOLOGISCHE ONCOLOGIE

### Dabrafenib – Trametinib

#### Schema

- Dabrafenib 150mg 2x/d PO continu – in monotherapie of in combinatie met trametinib
- Trametinib 2mg 1x/d PO continu

#### Opmerkingen

- Nuchtere inname: 2u na of 1u vóór de maaltijd met groot glas water
- Dabrafenib: capsules van 75mg
- Trametinib: bewaren in de koelkast, eens potje geopend ged. max 30d bewaren < 30°C

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, koude rillingen, asthenie, perifeer oedeem, griepig gevoel
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, abdominale pijn
- Cardiovasculair: hypertensie, bloedingen (waaronder intracranieële bloedingen en fatale bloedingen)
- Pulmonaal: nasofaryngitis, hoest
- Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid
- Musculoskeletaal: artralgie (ca. 25%), myalgie, spierspasmen, pijn in ledemaat
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, erytheem, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen, zelden pancreatitis

#### Dosisaanpassingen

- Bij pyrexie > 38°C: stop beide producten; herstart pas wanneer de patiënt 24u koortsvrij is. Een therapiepaauze geniet de voorkeur boven supportieve therapie (paracetamol, corticoiden, NSAID,...)
- Dosisniveau's

Dosisniveau	Dabrafenib (monotherapie of in combinatie met trametinib)	Trametinib (enkel in combinatie met dabrafenib)
Startdosis	150mg 2x/d	2mg 1x/d
1e dosisverlaging	100mg 2x/d	1.5mg 1x/d
2e dosisverlaging	75mg 2x/d	1mg 1x/d
3e dosisverlaging	50mg 2x/d	1mg 1x/d