

## HOOFD-HALS TUMOREN

### Carboplatin – Fluorouracil – Cetuximab

#### Schema

- Cetuximab 400 mg/m<sup>2</sup> laaddosis gevolgd door 250 mg/m<sup>2</sup> q1w
  - Cyclus 1: infusie over 2u in 250mL NaCl 0.9%, cyclus 2 en verder: infusie over 1u
- Carboplatin AUC 5 IV q3w (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
  - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125mL/min)
- 5-FU infusor 4000 mg/m<sup>2</sup> IV q3w (infusie over 4 dagen in 192 mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
  - Cetirizine 10mg PO 1 uur voor cetuximab
  - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie
  - Dexamethasone 10mg IV

#### Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
  - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor S. aureus surinfectie.
  - Jeuk: cetirizine
  - Xerose: vochtinbrengende crème
  - Eczeem: zwakke topische steroïden
  - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
  - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
- Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.,

#### Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, pijn, infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)
- Stijging van leverenzymen, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiëmie (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)

#### Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie:
  - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU