

## HOOFD-HALS TUMOREN

### Cetuximab

#### Schema

- Cetuximab 500 mg/m<sup>2</sup> IV q2w (of 400 mg/m<sup>2</sup> laaddosis gevolgd door 250 mg/m<sup>2</sup> q1w)
  - Cyclus 1: infusie over 2u in 250mL NaCl 0.9%, cyclus 2 en verder: infusie over 1u
- Supportieve medicatie
  - Cetirizine 10mg PO d1 1u voor start

#### Opmerkingen

- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
  - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor *S. aureus* surinfectie.
  - Jeuk: cetirizine
  - Xerose: vochtinbrengende crème
  - Eczeem: zwakke topische steroïden
  - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
  - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
  - Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.,

#### Nevenwerkingen

- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiemia (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)