

HOOFD-HALS TUMOREN

Cisplatin – Fluorouracil – Cetuximab

Schema

- Cetuximab 400 mg/m² laaddosis gevolgd door 250 mg/m² q1w
 - Cyclus 1: infusie over 2u in 250mL NaCl 0.9%, cyclus 2 en verder: infusie over 1u
- Cisplatin 100mg/m² IV q3w (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- 5-FU infusor 4000 mg/m² IV (infusie over 4 dagen in 192mL NaCl 0.9%)
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO 1 uur voor cetuximab
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie
 - Dexamethasone 10mg IV
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO op d1 + d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast
- DPD deficiëntie nagaan

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid
- Stijging van leverenzymen
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30: geen cisplatin
- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU