

BORSTCARCINOOM

Abemaciclib

Schema

- Abemaciclib 150 mg PO 2x/d continu

Opmerkingen

- Niet kauwen, mag samen met of los van de maaltijd
- Combinatie met letrozole of fulvestrant
- Weinig emetogeen, CAVE diarree (loperamide voorschrijven)
- Radiotherapie: overweeg pauze 2-3 dagen voor radiotherapie en herstart 2-3 dagen na radiotherapie
- Heelkunde: pauze 7 dagen voor ingreep en herstart na adequate wondheling

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: diarree, nausea, braken, anorexie, constipatie, stomatitis
- Hematologisch: neutropenie, anemie, thrombocytopenie
- Partiële alopecie, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, artralgie
- Stijging leverenzymen, serum creatinine
- Interstitiële longziekte, thrombo-embolieën

Dosisaanpassingen

- Verminderde nierfunctie: abemaciclib niet getest bij CrCl <30ml/min
- Ernstige hepatische dysfunctie bij start: abemaciclib 150mg 1x/dag
- Dosislevels:

Abemaciclib standaard	150mg 2x1/d
Abemaciclib 1 ^e dosisreductie	100mg 2x1/d
Abemaciclib 2 ^e dosisreductie	50mg 2x1/d

Belangrijke medicamenteuze interacties

- CYP3A4-inhibitoren (amiodarone, aprepitant, fluconazole, macroliden, pompelmoessap): toename toxiciteit van abemaciclib
- CYP3A4-inductoren (anti-epileptica, rifampicine, St-Janskruid): verminderde efficaciteit van abemaciclib