

BORSTCARCINOOM

Carboplatinum + Vinorelbine

Schema

- Carboplatinum AUC 5 IV op d1 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- Vinorelbine 25 mg/m² IV op d1 + d8 (infusie over 10 min in 140mL NaCl 0.9%, naspoeling 250mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie:
 - Dexamethasone 10mg IV op d1
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1

Opmerkingen

- Laxativa zo nodig voorschrijven (vinorelbine)
- Volg perifere neuropathie op (zie SOP polyneuropathie)

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, smaak en geur veranderingen, artralgie en myalgie, vermoeidheid, perifere neuropathie, partiële alopecie
- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, constipatie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Pulmonale toxiciteit
- Biochemisch: elektrolytenstoornissen, stijging AST/ALT

Dosisaanpassingen

- Hepatische dysfunctie bij start
 - Mild: reduceer vinorelbine met 25%
 - Matig: reduceer vinorelbine met 50%
 - Ernstig: STOP vinorelbine