

## BORSTCARCINOOM

# Docetaxel – Cyclofosfamide

### Schema

- Cyclofosfamide 600mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Docetaxel 75mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
  - Dexamethasone 20mg IV (1u voor chemo)
  - Akynzeo 300/0.5mg PO (1u voor chemo)

### Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.

### Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, artralgie en myalgie, vermoeidheid, vochtretentie, oculaire problemen, perifere neuropathie
- Hematologisch: anemie, neutropenie, thrombopenie
- Gastro-intestinaal: nausea en braken, veranderde geur en smaak, orale mucositis, diarree
- Cutaan: huiduitslag, partiële alopecie, nagelveranderingen
- Cardiotoxiciteit, hemorragische cystitis, blaasfibrose, hepatotoxiciteit, pulmonale toxiciteit

### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie:
  - eGFR 10-29 mL/min: reduceer cyclofosfamide met 25%
- Beperking leverfunctie:
  - Bilirubine > ULN: geen docetaxel
  - Bilirubine > 5mg/dL: geen cyclofosfamide