

BORSTCARCINOOM

Doxorubicine gepegyleerd liposomaal (Caelyx)

Schema

- Caelyx 50 mg/m² IV q4w of 25 mg/m² q2w (infusie over 60 min in 500mL glucose 5%)
 - Eerste toediening maximaal aan 1mg/min
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10 mg IV

Opmerkingen

- Onverenigbaar met NaCl 0.9%, tussenspoelen met glucose 5%
- Fototoxisch, zonnecrème
- Hartfunctie opvolgen: echocardiografie voor start en om de 3 maanden (zie ook SOP cardiotoxiciteit)

Nevenwerkingen

- Algemeen: haarverlies, handvoetsyndroom, huiduitslag, infusiegerelateerde reactie
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Gastro-intestinaal: nausea, stomatitis, braken, diarree, constipatie, dyspepsie
- Cardiovasculair: achteruitgang hartfunctie, cardiomyopathie, DVT, hypotensie, tachycardie, oedeem

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
 - Bilirubine > 1.2 mg/dL: reduceer Caelyx met 25%
 - Bilirubine > 3 mg/dL: reduceer Caelyx met 50%
 - Bilirubine > 5 mg/dL: Caelyx on hold