

Borstcarcinoom

Paclitaxel

Schema

- Paclitaxel 70, 80 of 90 mg/m² IV (infusie over 60 min in 250mL NaCl 0.9%)
- q1w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10mg IV (1u voor paclitaxel)
 - Cetirizine 10mg PO

Opmerkingen

- 70 mg/m²: geriatrische populatie of belangrijke comorbiditeiten
- 80 mg/m²: (neo-)adjuvante setting wekelijks continu, palliatieve setting wekelijks continu
- 90 mg/m²: palliatieve setting wekelijks 3 op 4 weken

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, vloeistofretentie, vermoeidheid, tranende ogen, nageltoxiciteit
- Haarverlies
- Hypersensitiviteitsreacties
- Hoofdpijn, spierpijn
- Stijging van de transaminasen

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine 1.5-2x ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Bilirubine 2-5x ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Bilirubine > 5x ULN: geen paclitaxel