

## BORSTCARCINOOM

### Palbociclib

#### Schema

- Palbociclib 125 mg PO 1x/d week 1-3 (week 4 pauze)

#### Opmerkingen

- Niet kauwen, mag samen met of los van de maaltijd
- Samen met letrozole of fulvestrant
- Eerste 2 cycli controle op dag 1 en 15, vanaf cyclus 3 enkel controle op dag 1
- Radiotherapie: overweeg pauze 2-3 dagen voor radiotherapie en herstart 2-3 dagen na radiotherapie
- Heelkunde: pauze 1 week voor ingreep en herstart na adequate wondheling

#### Nevenwerkingen

- Partiële alopecie, rash, xeroderma, vermoeidheid
- Gastro-intestinaal: nausea, breaken, diarree, anorexie, stomatitis, smaakstoornissen
- Hematologisch: neutropenie, anemie, thrombocytopenie
- Stijging leverenzymes, interstitieel longlijden/pneumonitis

#### Dosisaanpassingen

- Hepatische dysfunctie bij start: palbociclib niet getest bij matige/ernstige dysfunctie
- Dosislevels:

|  |             |
|--|-------------|
| Palbociclib standaard                    | 125mg 1x1/d |
| Palbociclib 1 <sup>e</sup> dosisreductie | 100mg 1x1/d |
| Palbociclib 2 <sup>e</sup> dosisreductie | 75mg 1x1/d  |