

BORSTCARCINOOM

Ribociclib

Schema

- Ribociclib 600mg PO 1x/d week 1-3 (week 4 pauze)

Opmerkingen

- Tabletten van 200mg, niet kauwen, mag samen met of los van de maaltijd
- Samen met letrozole of fulvestrant
- ECG voor start (enkel starten zo QTcF < 450ms) en op d15 van eerste cyclus en d1 van tweede cyclus, aandacht voor concomitante medicatie, ionenstoornissen (controle op d1 van eerste zes cycli)
- Radiotherapie: overweeg pauze 2-3 dagen voor radiotherapie en herstart 2-3 dagen na radiotherapie
- Heelkunde: pauze 7d voor ingreep en herstart na adequate wondheling

Nevenwerkingen

- Verlenging QT-interval, alopecie, jeuk, rash, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, stomatitis (mondspoeling voorschrijven), diarree, anorexie, constipatie
- Hematologisch: neutropenie, anemie, thrombocytopenie
- Daling serum albumine/glucose/fosfaat/kalium, stijging leverenzymes/serum creatinine
- Hoest, dyspneu, pneumonitis, pulmonaire fibrose, perifere oedemen, artralgie

Dosisaanpassingen

- Matige/ernstige hepatische dysfunctie bij start: start met 400mg 1x/d ipv 600mg 1x/d
- QTc verlenging:
 - Niet gebruiken indien: lang-QT syndroom, ongecontroleerde of ernstige cardiale ziekte (recent myocardinfarct, congestief hartfalen, onstabiele angina, bradyarythmieën), elektrolytenstoornissen
 - QTcF > 480 ms: pauzeer tot QTcF < 481 ms, hervat 1 dosislevel lager en controleer ECG om de 1-2w
 - QTcF > 500 ms of > 60 ms hoger dan baseline én torsades de pointes of polymorphische ventriculaire tachycardie of onverklaarde syncope of andere ernstige arythmie: STOP ribociclib
- Dosislevels:

Ribociclib standaard	600mg 1x/d
Ribociclib 1 ^e dosisreductie	400mg 1x/d
Ribociclib 2 ^e dosisreductie	200mg 1x/d