

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Carboplatin AUC 2.7 – Paclitaxel 60mg/m² wekelijks

Schema

- Paclitaxel 60mg/m² IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
- Carboplatin AUC 2.7 IV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 405mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q1w
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO
 - Akynzeo 300/0.5mg PO
 - Dexamethasone 10mg IV (1u voor paclitaxel)
 - Filgrastim 300µg op d5

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nageltoxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bilirubine 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bilirubine 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bilirubine > 5 ULN: geen paclitaxel.