

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Carboplatin – Gemcitabine – Bevacizumab

Schema

- Bevacizumab 15mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Eerste toediening: over 90 min
 - Tweede toediening: over 60 min
- Gemcitabine 1000 mg/m² IV d1 + 8 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Carboplatin AUC 4 d1 (infusie over 60 min in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 600mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO d1 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV d1 + d8

Opmerkingen

- Bevacizumab
 - Proteïnurie nagaan voor toediening via dipstick
 - Bloeddruk strikt opvolgen
 - Te pauzeren bij heelkunde
 - Stop 4-6 weken voor majeure chirurgie
 - Stop 1 week voor kleinere heelkunde
 - Contra-indicaties: arteriële trombose

Nevenwerkingen

- Algemeen: haarverlies, vermoeidheid, griepaal gevoel
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie, zeldzaam TTP
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, abdominale pijn, constipatie, diarree
- Hypocalcemie, - magnesiëmie, kaliëmie, en natremie
- Stijging leverenzymes
- Bevacizumab
 - Hypertensie, proteïurie, vertraagde wondheling
 - Arteriële thrombose (zeker bij patiënten > 65j met voorgeschiedenis van arteriële thrombose)
 - Bloeding, fistulisatie, perforatie
 - Zeldzaam: episode van reversibel posterior leukoencefalopathiesyndroom (RPLS)

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
 - Bilirubine > 1.5 ULN: reduceer gemcitabine met 25%