

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Niraparib

Schema

- Niraparib 200mg 1x/d PO continu
 - 300mg indien gewicht > 77 kg én baseline bloedplaatjestelling \geq 150 000/ μ l

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel
- Bij nausea en/of braken: inname 's avonds
- Bij gemiste of uitgebraakte dosis: dosis niet inhalen

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid
- Cardiovasculair: hypertensie
- Endocrien: verlaagd serum magnesium, verhoogd serum glucose
- Gastro-intestinaal: constipatie, anorexie, dysgeusie, dyspepsie, nausea, braken, xerostomie
- Hematologisch: anemie, neutropenie, thrombocytopenie
- Stijging van leverenzymen
- Neurologisch: duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid
- Musculoskeletaal: rugpijn, myalgie
- Renaal: acute nierinsufficiëntie, verhoging serum creatinine
- Pulmonaal: hoest, dyspneu, nasofaryngitis (13%)

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie:
 - Bilirubine > 1,5 x - 3 x ULN: startdosis 200mg
 - Bilirubine > 3 x ULN: geen niraparib