

SCHILDKLIERCARCINOOM

Cabozantinib

Schema

- Cabozantinib (Cabometyx) 60 mg 1x1/d PO continu

Opmerkingen

- Nuchtere inname (1 uur voor of 2 uur na de maaltijd)
- Tabletten van 60mg, 40mg en 20mg
- Bij intolerantie te reduceren tot 40mg 1x1/d, nadien eventueel naar 20mg 1x1/d
- Steeds hoeveelheid resterende medicatie navragen (doosjes van 30 tabletten)
- Niet starten bij ongecontroleerde hypertensie, recente bloeding of trombo-embolie
- Stop 3 weken voor chirurgie (incl. tandingrepen). Herstart ten vroegste 2 weken post-operatief, en na wondgenezing
- Systematisch opvolgen van bloeddruk, glycemie, leverset en schildklierfunctie

Nevenwerkingen

- Diarree, hypertensie, vermoeidheid, anorexie, nausea, braken, abdominale pijn, haarverdunding, haarontkleuring, hand-voet-syndroom, erythrodermie, hyperglycemie, leverfunctiestoornissen
- Cave arteriële of veneuze trombo-embolie, corfalen, proteinurie, vertraagde wondheling/perforatie/fistulisatie, bloeding
- Neurologisch: reversiebele posterieure leukoencefalopathie syndroom (RPLS)

Dosisaanpassingen

- Hepatisch gemetaboliseerd
- Start aan gereduceerde dosis bij matige leverdysfunctie of CYP3A4 inhibitoren.