

SCHILDKLIERCARCINOOM

Selpercatinib

Schema

- Selpercatinib 160mg 2x/d PO continu
 - Indien <50 kg: 120mg 2x/d

Opmerkingen

- Steeds 12u tussen de toedieningen.
- Inname met of zonder voedsel, steeds op dezelfde wijze.
 - Indien concomitant PPI: in te nemen bij het eten.
- Capsules van 80 mg en 40 mg.
- Aandacht voor QTc-verlengende medicatie
- Controle levertesten om de 2 weken

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit
- Levertoxiciteit
- Cardiaal: QTc verlenging, hypertensie, bloedingen
- Pulmonaal: pneumonitis

Dosisaanpassingen

- Geen dosisaanpassingen bij verminderde nierfunctie
- Indien ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pugh C): start met 80mg 2x/d
- Indien co-administratie met sterke CYP3A-inhibitor: reduceer dosis met 50%

Dosis aanpassingen	>50kg	<50kg
Startdosis	160 mg 2x/dag	120 mg 2x/dag
1 ^e dosisreductie	120 mg 1x/dag	80 mg 2x/dag
2 ^e dosisreductie	80 mg 1x/dag	40 mg 2x/dag
3 ^e dosisreductie	40 mg 1x/dag	STOP