

SCHILDKLIERCARCINOOM

Vandetanib

Schema

- Vandetanib 300mg 1x/dag PO continu

Opmerkingen

- Dagelijkse inname met of zonder voedsel op +/- zelfde tijdstip.
- Tabletten van 300mg en 100mg
- Aandacht voor QTc-verlengende medicatie.
- Fototoxiciteit, zonnecrème aanraden
- Vertraagde wondheling: minstens 4 weken voor heelkundige ingreep te stoppen, herstarten na adequate wondheling

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, vertraagde wondheling, infecties, hypothyroïdie, asthenie, vermoeidheid, infecties
- Gastro-intestinaal: diarree, transaminitis, anorexie, stomatitis, abdominale pijn, nausea en braken.
- Cardiaal: QTc verlenging, bloedingen, hypertensie
- Cutaan: fototoxiciteit, toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome
- Renaal: verminderde nierfunctie, ionenstoornissen, proteïnurie, oedemen
- Pulmonaal: pneumonitis
- Oftalmologisch: wazig zicht, veranderingen van cornea
- Neurologisch: PRES, RPLS, hoofdpijn, paresthesieën, dysesthesieën, tremor, hersenoedeem, insomnia, depressie

Dosisaanpassingen

- Verminderde nierfunctie
 - eGFR 30-50 mL/min: start aan 200 mg 1x/dag
 - eGFR <30 mL/min: geen gegevens, niet aangeraden.
- Verminderde leverfunctie (vanaf bilirubine >1.5x ULN): geen gegevens, niet aangeraden.