

GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

Abiraterone

Schema

- Abiraterone 1000mg 1x/d

Opmerkingen

- Nuchtere inname: 1u voor of 2u na de maaltijd
- Tabletten van 500 en 1000mg
- In combinatie met prednison 5mg 2x/d
- Eerste 3 cycli: elke 2w controle van bloeddruk en labo, nadien om de 3 maanden (incl PSA en testosteron)
- Echocardiografie op klinische indicatie

Nevenwerkingen

- Hepatotoxiciteit, hypokaliëmie (agressief behandelen), hypertensie, oedemen
- Gastro-intestinaal: constipatie, diarree, dyspepsia
- Vermoeidheid, insomnia, arthralgie, myalgie, zwelling van gewrichten
- Pulmonaal: hoest, dyspneu, bovenste luchtweginfectie, nasofaryngitis
- Vapeurs, hyperglycemie, hypertriglyceridemie

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine 1.5 – 3 x ULN en ALT 2.5 – 5 x ULN: zet abiraterone verder en controleer wekelijks
 - Bilirubine > 3 x ULN of ALT > 5 x ULN: pauzeer abiraterone, herstart als recuperatie tot graad 0-1 en reduceer dosis met 250mg