

GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

Axitinib

Schema

- Axitinib 5mg PO 2x1/d continu

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel
- Bij goede tolerantie per 6w op te drijven tot 2x7mg/d en dan 2x10mg/d
- Afgeleverd in doosjes van 1mg of 5mg, met telkens 28 of 56 tabletten
- Bij intolerantie te reduceren tot 2x3mg/d en dan 2x2mg/d
- Stop 2d voor chirurgie (incl tandingrepen), herstart ten vroegste 2w post-operatief en na wondgenezing
- Niet starten bij ongecontroleerde hypertensie, recente bloeding of trombo-embolie
- Systematisch opvolgen van bloeddruk en schildklierfunctie

Nevenwerkingen

- Diarree, hypertensie, vermoeidheid, anorexie, nausea, dysfonie, hoest, hand-voet-syndroom, hypothyroidie, constipatie
- CAVE arteriële of veneuze trombo-embolie, corfalen, proteinurie, vertraagde wondheling/perforatie/fistulisatie, bloeding

Dosisaanpassingen

- Hepatisch gemetaboliseerd.
- Start aan gereduceerde dosis bij matige leverdysfunctie of CYP3A4 inhibitoren.