

GENITO-URINAIRE TUMOREN

Cisplatin – Gemcitabine

Schema

- Gemcitabine 1000 mg/m² IV d1 + 8 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Cisplatin 70 mg/m² IV d1 (infusie over 60 min in 500mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO d1 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV bolus d1 + d8
 - Dexamethasone 8mg PO d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO d1 + d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Audiometrie voor start cisplatin
- CAVE IV contrast

Nevenwerkingen

- Algemeen: haarverlies, vermoeidheid, griepachtige symptomen
- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrototoxiciteit (vermijd NSAID)
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie, mucositis
- Zeldzaam: TTP (opvolgen bloedplaatjes)

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
 - eGFR 45-60: reduceer cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45: reduceer cisplatin met 50%
 - eGFR <30: geen cisplatin
- Beperking leverfunctie
 - Bilirubine > 1.5 ULN: reduceer gemcitabine met 25%