

## GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

### Darolutamide

#### Schema

- Darolutamide 600mg 2x/d continu

#### Opmerkingen

- Tabletten van 300mg
- Niet breken of kauwen, innamen met voedsel en water
- Gemiste innamen zo snel mogelijk inhalen, geen 2 dosissen tegelijk innemen om gemiste dosis in te halen
- Eerste 3 cycli: elke 4w controle van bloeddruk en labo, nadien om de 2-3 maanden

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid/asthenie, spier- en skeletpijn, pijn in extremiteiten, fracturen
- Hematologie: neutropenie
- Biochemisch: verhoogd bilirubine/AST
- Cardiaal: ischemische hartziekte, hartfalen
- Dermatologisch: huiduitslag

#### Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
  - Matig en ernstig (Child-Pugh B en C): start aan 300mg 2x/d
- Nierinsufficiëntie
  - eGFR 15-29 mL/min: start aan 300mg 2x/d

#### Belangrijke medicamenteuze interacties

- Sterke inductoren van CYP3A4 en P-gp vermijden
- Vermijd rosuvastatine
- Gelijktijdige toediening van darolutamide kan de plasmaconcentraties van andere BCRP, OATP1B1 en OATP1B3-substraten (bv. methotrexaat, sulfasalazine, fluvastatine, atorvastatine, pitavastatine) verhogen