

## GENITO-URINAIRE TUMOREN

### Gemcitabine - Oxaliplatin

#### Schema

- Gemcitabine 1000 mg/m<sup>2</sup> IV d1 + d8 (infusie over 30min in 250mL NaCl 0.9%)
- Oxaliplatin 130 mg/m<sup>2</sup> IV d1 (infusie over 2u in 250mL glucose 5%)
- q3w
- Supportieve medicatie
  - Palonosetron 250 µg IV op d1 (30 min voor chemotherapie)
  - Dexamethasone 10 mg IV op d1 + d8
  - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3

#### Opmerkingen

- Contact met koude vermijden de eerste 3 dagen

#### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust
- Oxaliplatine-gerelateerd: neuropathie, laryngofaryngeale dysesthesie
- Gemcitabine-gerelateerd: griepaal syndroom
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie

#### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie
  - eGFR 30 – 49 mL/min: reduceer oxaliplatin met 25%
- Beperking leverfunctie
  - Bilirubine > 1.5 ULN: reduceer gemcitabine met 25%