

GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

Ipilimumab – Nivolumab

Schema

- Eerst vier cycli combinatietherapie
 - Nivolumab 3 mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Ipilimumab 1 mg/kg IV d1 (infusie over 90 min in 50mL NaCl 0.9%)
 - q3w
- Nadien onderhoudsbehandeling met
 - Nivolumab 3 mg/kg IV d1 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - q2w

Opmerkingen

- Immunotherapie startbilan te doen voor start
- TSH elke keer controleren

Nevenwerkingen

- Auto-immune toxiciteit: kan ontstaan op elk tijdstip (meestal de eerste zes maanden)
- Vermoeidheid, jeuk, rash, thyroiditis, hypothyroidie, diabetes mellitus type 1, hypofysisis, hepatitis, colitis, gastritis, nefritis, pneumonitis, myocarditis
- Verminderde eetlust, nausea, gewichtsverlies, infuus-gerelateerde nevenwerkingen
- Elke mogelijke andere auto-immuunreactie is mogelijk, incl. nieuw ontstaan of verergeren van onderliggende auto-immuunziekten (reumatologisch, systeemziekten, neurologisch, endocrinologisch etc)

Dosisaanpassingen

- Immuunotoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))