

## GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

### Sunitinib

#### Schema

- Sunitinib 50mg 1x1/d PO ged. 4 weken, gevolgd door 2 weken rust

#### Opmerkingen

- Inname met (laag vetgehalte) of zonder voedsel, bij voorkeur 's morgens
- Tabletten van 12.5mg, 25mg en 50mg
- Bij intolerantie te reduceren tot 37,5mg 1x/d en dan 25mg 1x/d.
- Stop 3w voor chirurgie (incl tandingrepen), herstart ten vroegste 2w post-operatief en na wondgenezing
- Niet starten bij congestief hartfalen, ongecontroleerde hypertensie, recente bloeding of trombo-embolie
- Bepaal baseline linkerventrieklejectiefractie + opvolging elke drie maanden
- Systematisch opvolgen van bloeddruk en schildklierfunctie

#### Nevenwerkingen

- Hypertensie, huid- en haarverandering, oedeem
- Diarree, vermoeidheid, nausea, anorexie, stomatitis, HVS, hypothyroïdie, levertoxiciteit
- Cardiotoxiciteit
- Arteriële of veneuze trombo-embolie, proteinurie, vertraagde wondheling/perforatie/fistulisatie, bloeding

#### Dosisaanpassingen

- Hepatisch gemetaboliseerd.
- Start aan gereduceerde dosis bij matige leverdysfunctie of CYP3A4 inhibitoren.