

## BORSTCARCINOOM

# Carboplatinum + Vinorelbine

### Schema

- Vinorelbine 25 mg/m<sup>2</sup> IV op d1 + d8 (infusie over 10 min in 100mL NaCl 0.9%, naspoeling 250mL NaCl 0.9%)
- Carboplatinum AUC 5 IV op d1 (infusie over 1u in 250mL glucose 5%)
  - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w
- Supportieve medicatie:
  - Dexamethasone 10mg IV op d1 (30 min voor chemotherapie)
  - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemotherapie)

### Opmerkingen

- Laxativa zo nodig voorschrijven (vinorelbine)
- Volg perifere neuropathie op (zie SOP polyneuropathie)

### Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, smaak en geur veranderingen, artralgie en myalgie, vermoeidheid, perifere neuropathie, partiële alopecie
- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, constipatie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Pulmonale toxiciteit
- Biochemisch: elektrolytenstoornissen, stijging AST/ALT

### Dosisaanpassingen

- Hepatische dysfunctie bij start
  - Mild: reduceer vinorelbine met 25%
  - Matig: reduceer vinorelbine met 50%
  - Ernstig: STOP vinorelbine