

BORSTCARCINOOM

Docetaxel – Cyclofosfamide

Schema

- Docetaxel 75mg/m² IV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
- Cyclofosfamide 600mg/m² IV (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 20mg IV (30 min voor chemotherapie)
 - Akynzeo 300/0.5mg PO (1u voor chemotherapie)
 - Pegfilgrastim 6mg SC (24u na einde chemotherapie)

Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.
- Ter preventie van hemorragische cystitis: 1.5L extra perorale hydratatie tot 24u na einde chemotherapie

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, artralgie en myalgie, vermoeidheid, vochtretentie, oculaire problemen, perifere neuropathie
- Hematologisch: anemie, neutropenie, thrombopenie
- Gastro-intestinaal: nausea en braken, veranderde geur en smaak, orale mucositis, diarree
- Cutaan: huiduitslag, partiële alopecie, nagelveranderingen
- Cardiotoxiciteit, hemorragische cystitis, blaasfibrose, hepatotoxiciteit, pulmonale toxiciteit

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie:
 - eGFR 10-29 mL/min: reduceer cyclofosfamide met 25%
- Beperking leverfunctie:
 - Bilirubine > ULN: geen docetaxel
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen cyclofosfamide