

BORSTCARCINOOM

Epirubicine

Schema

- Epirubicine 25 mg/m² IV q1w of 75 mg/m² IV q3w (infuus over 20 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
 - Palonosetron 250 µg IV op d1 (30 min voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 (30 min voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3

Opmerkingen

- Fototoxisch: zonnecrème
- Maximale cumulatieve dosis 900 mg/m² (andere risicofactoren vb. radiotherapie linkszijdig in rekening brengen)
- Hartfunctie opvolgen (zie SOP cardiotoxiciteit)

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, hypersensitiviteit, vertigo, conjunctivitis
- Cardiale toxiciteit
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, mucositis, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, anemie, thrombopenie
- Cutaan: alopecie, rash, pruritus, nagelveranderingen, hyperpigmentatie, radiatie recall fenomeen, fotosensitiviteit

Dosisaanpassingen

- Verminderde nierfunctie:
 - Dosisaanpassing bij serumcreatinine > 5mg/dL
- Gedaalde leverfunctie
 - Bilirubine 1.2-3 mg/dL of AST > 2x ULN: reduceer epirubicine met 50%
 - Bilirubine > 3mg/dL of AST > 4x ULN: reduceer epirubicine met 75%
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen epirubicine