

BORSTCARCINOOM

Methotrexaat PO + Cyclofosfamide PO

Schema

- Methotrexaat 2.5mg PO 2x/d op d1-d2, d8-d9, d15-d16, d22-d23 q4w
- Cyclofosfamide 50mg PO 1x/d continu

Opmerkingen

- Beiden verkrijgbaar via thuisapotheek
- Met of zonder de maaltijd innemen, bij voorkeur steeds op dezelfde manier, niet kauwen
- Cyclofosfamide bij voorkeur 's morgens
- Fototoxisch: zonnecrème aanraden
- Alcohol vermijden
- Methotrexaat uit het licht bewaren

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, partiële alopecie, hyperpigmentatie, geur- en smaak veranderingen, hemmoragische cystitis
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, orale mucositis
- Myelotoxiciteit (vnl. neutropenie), pulmonale toxiciteit

Dosisaanpassingen

- Nierfunctie
 - eGFR < 50 mL/min: reduceer methotrexaat met 50%
- Verminderde leverfunctie
 - Bilirubine 3.1-5 mg/dL of AST/ALT > 3x ULN: reduceer methotrexaat en cyclofosfamide met 25%
 - Bilirubine > 5 mg/dL: geen methotrexaat, geen cyclofosfamide