

BORSTCARCINOOM

Paclitaxel – Gemcitabine

Schema

- Paclitaxel 175 mg/m² IV op d1 (infusie over 3u in 500mL NaCl 0.9%)
- Gemcitabine 1250 mg/m² IV op d1 + d8 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie:
 - Cetirizine 10mg PO op d1 (1u voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 20mg IV op d1 (30 min voor chemotherapie)
 - Litan 50mg IV bolus d1 + d8 (30 min voor chemotherapie)

Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.

Nevenwerkingen

- Algemeen: hypersensitiviteit, vermoeidheid, griepaal syndroom
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, diarree, constipatie, buikkrampen, transaminasemie, anorexie, mucositis
- Hematologisch: myelotoxisch, TTP (zeldzaam, gemcitabine)
- Cutaan: haarverlies, huiduitslag, nageltoxiciteit, epistaxis
- Cardiaal: aritmie, DVT

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine 1.5-2x ULN: 25% reductie paclitaxel en gemcitabine
 - Bilirubine 2-5x ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Bilirubine > 5x ULN: geen paclitaxel, geen gemcitabine