

## Borstcarcinoom

# Paclitaxel

### Schema

- Paclitaxel 70, 80 of 90 mg/m<sup>2</sup> IV (infusie over 60 min in 250mL NaCl 0.9%)
  - In 250mL glucose 5% zo dose banding
- q1w
- Supportieve medicatie
  - Cetirizine 10mg PO (1u voor paclitaxel)
  - Dexamethasone 10mg IV (30 min voor paclitaxel)

### Opmerkingen

- 70 mg/m<sup>2</sup>: geriatrische populatie of belangrijke comorbiditeiten
- 80 mg/m<sup>2</sup>: (neo-)adjuvante setting wekelijks continu, palliatieve setting wekelijks continu
- 90 mg/m<sup>2</sup>: palliatieve setting wekelijks 3 op 4 weken

### Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, vloeistofretentie, vermoeidheid, tranende ogen, nageltoxiciteit
- Haarverlies
- Hypersensitiviteitsreacties
- Hoofdpijn, spierpijn
- Stijging van de transaminasen

### Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
  - Bilirubine 1.5-2x ULN: 25% reductie paclitaxel
  - Bilirubine 2-5x ULN: 50% reductie paclitaxel
  - Bilirubine > 5x ULN: geen paclitaxel