

## BORSTCARCINOOM

# Trastuzumab

### Schema

- Subcutaan 600mg (over 2-5min, afwisselend linker- en rechterdij, op 2.5 cm van eerdere injectieplaats)
  - Observatie gedurende 30 min na toediening
- OF
- Intraveneus
  - Eerste toediening: 8mg/kg (infusie over 90 min in 250mL NaCl 0.9%)
  - Tweede toediening: 6mg/kg (infusie over 60 min in 250mL NaCl 0.9%)
  - Vanaf derde toediening: 6mg/kg (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- q3w

### Opmerkingen

- Hartfunctie opvolgen (zie SOP cardiotoxiciteit)
  - Voor start behandeling: ECG en TTE; tijdens behandeling TTE q3m herhalen
  - Na behandeling: TTE q6m herhalen tot 24 maanden na laatste toediening; gebruik anthracyclines vermijden gedurende 7 maanden na laatste toediening
  - Voorzichtig zijn bij patiënten met verhoogd risico op cardiale disfunctie, vb. hypertensie, voorgeschiedenis myocardinfarct, congestief hartfalen, LVEF van < 55%, hogere leeftijd
- Gemiste dosis IV
  - Indien < 6w: geen dosisaanpassing nodig, zo snel mogelijk te geven
  - Indien > 6w: oplaaddosis 8mg/kg geven

### Nevenwerkingen

- Cardiale toxiciteit
- Infuus gerelateerde nevenwerkingen