

GENITO-URINAIRE ONCOLOGIE

Pembrolizumab - Lenvatinib

Schema

- Pembrolizumab 200mg IV q3w of 400mg IV q6w (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Lenvatinib 20 mg PO 1x/d bij voorkeur 's morgens

Opmerkingen

- Pembrolizumab
 - Immunotherapie startbilan te doen voor start
 - TSH elke keer controleren
- Lenvatinib
 - Met of zonder voedsel (steeds op dezelfde manier)
 - Dosis inhalen kan tot 12u voor volgende dosis, bij braken dosis niet inhalen
 - Capsules van 4 mg en 10 mg
 - Aandacht voor QTc-verlengende medicatie, bloeddruk
 - Opletten met combinatie met bisfosfonaten en/of andere angiogeneseremmers

Nevenwerkingen

- Pembrolizumab
 - Infuus gerelateerde nevenwerkingen
 - Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))
- Lenvatinib
 - Hypertensie, proteïnurie, dysfonie
 - Diarree
 - Hand-voet syndroom
 - Vermoeidheid, anorexie

Dosisaanpassingen

- Bij ernstige leverfunctiestoornissen (Child-Pugh C) of ernstig nierfalen: start aan 14 mg 1x/dag
- Bij eind-stadium nierfalen: STOP lenvatinib.