

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Carboplatin – Gepegyleerd liposomaal doxorubicine

Schema

- Gepegyleerd liposomaal doxorubicine 30mg/m² (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Eerste toediening maximaal aan 1mg/min
- Carboplatin AUC 5 (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q4w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV

Opmerkingen

- Gepegyleerd liposomaal doxorubicine:
 - Onverenigbaar met NaCl 0.9%, tussenspoelen met glucose 5%
 - Fototoxisch, zonnecrème
 - Hartfunctie opvolgen: echocardiografie voor start en om de 3 maanden (zie ook SOP cardiotoxiciteit)

Nevenwerkingen

- Algemeen: haarverlies, vermoeidheid, handvoetsyndroom, huiduitslag, infusiegerelateerde reactie
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Gastro-intestinaal: nausea, stomatitis, braken, diarree, constipatie, dyspepsie, diarree
- Hypocalcemie, -magnesiëmie, -kaliëmie, en -natremie
- Stijging leverenzymes
- Cardiovasculair: achteruitgang hartfunctie, cardiomyopathie, DVT, hypotensie, tachycardie, oedeem

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
 - Bilirubine > 1.2 mg/dL: reduceer gepegyleerd liposomaal doxorubicine met 25%
 - Bilirubine > 3 mg/dL: reduceer gepegyleerd liposomaal doxorubicine met 50%
 - Bilirubine > 5 mg/dL: gepegyleerd liposomaal doxorubicine on hold