

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Carboplatin – Paclitaxel – Dostarlimab

Schema

- Dostarlimab 500mg IV (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Paclitaxel 175mg/m² IV (infusie over 3 uur in 500mL glucose 5%)
- Carboplatin AUC 5 IIV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w gedurende 6 cycli, daarna dostarlimab monotherapie 1000mg IV q6w verder
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO
 - Akynzeo 300/0.5mg PO
 - Dexamethasone 20mg IV (1u voor paclitaxel)

Opmerkingen

- Enkel indien MMRd
- Immunotherapie startbilan bloedname voor start
- TSH elke keer opvolgen

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nagel toxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn
- Dostarlimab:
 - Infuus gerelateerde nevenwerkingen
 - Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bilirubine 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bilirubine 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bilirubine > 5 ULN: geen paclitaxel.