

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Cisplatin – Doxorubicine

Schema

- Doxorubicine 60mg/m² IV (infusie over 10 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Cisplatin 50mg/m² IV (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1
 - Dexamethasone 10mg IV op d1
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olazapine 5mg PO d1 + d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Cisplatin
 - Audiometrie voor start behandeling
 - CAVE IV contrast
- Doxorubicine
 - Maximale cumulatieve dosis 550 mg/m²
 - Baseline echocardiografie

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken, diarree, constipatie, stomatitis/mucositis, anorexie
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Huid: alopecie, flebitis, recall dermatitis
- Vermoeidheid, stijging van leverenzymen
- Cardiaal: cardiomyopathie, arrythmieën

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30 mL/min: geen cisplatin
- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine 1.2-3 mg/dL: reduceer dosis doxorubicine met 50%
 - Bilirubine 3- 5mg/dL: reduceer dosis doxorubicine met 75%
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen doxorubicine