

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Cisplatin – Fluorouracil

Schema

- Levofolinezuur 200mg/m² IV (infusie over 15 min in 150mL NaCl 0.9%)
- 5-FU bolus 400mg/m² IV (infusie over 15 min in 50mL glucose 5%)
- Cisplatin 50mg/m² IV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
- 5-FU infusor 2400mg/m² IV (infusor over 48 uur in 120mL NaCl 0.9%)
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO (1u voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 10mg IV
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5 mg PO op d1 + d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)
- Haarverlies, vermoeidheid
- Stijging leverenzymes

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30 mL/min: geen cisplatin
- Beperking leverfunctie:
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU