

## GYNÄCOLOGISCHE TUMOREN

### Doxorubicine

#### Schema

- Doxorubicine 60mg/m<sup>2</sup> IV q3w (infusie over 10 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
  - Palonosetron 250 µg IV bolus op d1
  - Dexamethasone 10mg IV op d1
  - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3

#### Opmerkingen

- Maximale cumulatieve dosis 550 mg/m<sup>2</sup> (andere risicofactoren vb. radiotherapie linkszijdig in rekening brengen)
- Hartfunctie opvolgen (zie SOP cardiotoxiciteit)

#### Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, diarree, constipatie, stomatitis/mucositis, anorexie
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Huid: alopecia, flebitis, recall dermatitis
- Vermoeidheid, stijging van leverenzymes
- Cardiaal: cardiomyopathie, arrythmieën

#### Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
  - Bilirubine 1.2-3 mg/dL: reduceer dosis doxorubicine met 50%
  - Bilirubine 3- 5mg/dL: reduceer dosis doxorubicine met 75%
  - Bilirubine > 5mg/dL: geen doxorubicine