

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Pembrolizumab - Lenvatinib

Schema

- Pembrolizumab 200mg q3w of 400mg q6w IV (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Lenvatinib 20mg PO 1x/d continu

Opmerkingen

- Pembrolizumab
 - Immunotherapie startbilan bloedname voor start
 - TSH elke keer opvolgen
- Lenvatinib
 - Met of zonder voedsel (steeds op dezelfde manier)
 - Dosis inhalen kan tot 12u voor volgende dosis, bij braken dosis niet inhalen
 - Capsules van 4 mg en 10 mg
 - Aandacht voor QTc-verlengende medicatie, bloeddruk
 - Opletten met combinatie met bisfosfonaten en/of andere angiogeneseremmers

Nevenwerkingen

- Pembrolizumab
 - Infuus gerelateerde nevenwerkingen
 - Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))
- Lenvatinib
 - Hypertensie, proteïnurie, dysfonie
 - Diarree
 - Hand-voet syndroom
 - Vermoeidheid, anorexie

Dosisaanpassingen

- Bij ernstige leverfunctiestoornissen (Child-Pugh C) of ernstig nierfalen: start lenvatinib aan 10mg 1x/d
- Nier- en leverinsufficiëntie tijdens behandeling
 - Graad 3: pauzeer lenvatinib
 - Graad 4: STOP lenvatinib
- Dosislevels lenvatinib

Startdosis	20mg
Eerste dosisreductie	14mg
Tweede dosisreductie	10mg
Derde dosisreductie	8mg