

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Trastuzumab

Schema

- Trastuzumab IV 8 mg/kg laaddosis gevolgd door 6 mg/kg q3w (in 250mL NaCl 0.9%)
- Eerste toediening over 90 min, tweede toediening over 60 min, vanaf derde toediening over 30 min

Opmerkingen

- Niet terugbetaald in deze setting, via stalen
- Hartfunctie opvolgen (zie SOP cardiotoxiciteit)
 - Voor start behandeling: ECG en TTE; tijdens behandeling TTE q3m herhalen
 - Na behandeling: TTE q6m herhalen tot 24 maanden na laatste toediening; gebruik anthracyclines vermijden gedurende 7 maanden na laatste toediening
 - Voorzichtig zijn bij patiënten met verhoogd risico op cardiale disfunctie, vb. hypertensie, voorgeschiedenis myocardinfarct, congestief hartfalen, LVEF van < 55%, hogere leeftijd
- Gemiste dosis IV
 - Indien < 6w: geen dosisaanpassing nodig, zo snel mogelijk te geven
 - Indien > 6w: oplaaddosis 8mg/kg geven

Nevenwerkingen

- Cardiale toxiciteit
- Infuus gerelateerde nevenwerkingen