

## HOOFD-HALS TUMOREN

### Cisplatin – Etoposide

#### Schema

- Cisplatin 80 mg/m<sup>2</sup> IV op d1 (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- Etoposide 100 mg/m<sup>2</sup> IV op d1 + d2 + d3 (infusie over 1 uur in 500 ml NaCl 0.9%)
- Q3w
- Prehydratatie d1: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie:
  - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemotherapie)
  - Dexamethasone 10mg IV bolus op d1 (30 min voor chemotherapie)
  - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
  - Olanzapine 5mg PO d1 (1u voor chemotherapie) + d2 + d3 + d4

#### Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast

#### Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid

#### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie:
  - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 25%
  - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 50%
  - eGFR <30 mL/min: geen cisplatin
- Beperking leverfunctie:
  - Bilirubine 1,5 – 3 mg/dL: reduceer etoposide met 50%
  - Bilirubine > 3 mg/dL: geen etoposide