

SARCOOM

Docetaxel + Gemcitabine

Schema

- Gemcitabine 900 mg/m² IV d1 + d8 (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Docetaxel 100 mg/m² IV d8 (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
- q3w
- Premedicatie
 - Dexamethasone 20mg IV op d8 (1u voor chemotherapie)
- Supportieve medicatie
 - Litan 50mg IV op d1 + d8

Opmerkingen

- Perifere neuropathie opvolgen. Zie SOP polyneuropathie.

Nevenwerkingen

- Algemeen: griepaal syndroom, vermoeidheid, hypersensitiviteit, artralgie, myalgie, vochtretentie, oculaire problemen, perifere neuropathie, geur- en smaakveranderingen
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Cutaan: rash, hand-voet syndroom, partiele alopecie, nagelveranderingen
- Zeldzaam: TTP (gemcitabine)

Dosisaanpassingen

- Leverfunctiestoornissen:
 - Bilirubine > ULN: geen docetaxel
 - Bilirubine > 1.5x ULN: reduceer gemcitabine met 25%