

## SARCOOM

# Pazopanib

### Schema

- Pazopanib 800 mg 1x1/d PO continu

### Opmerkingen

- Nuchtere inname (1 uur voor of 2 uur na de maaltijd)
- Pillen van 200 en 400mg
- Bij intolerantie te reduceren in stappen van 200mg
- Niet starten bij leverdysfunctie, ongecontroleerde hypertensie, recente bloeding of trombo-embolie
- Opvolgen: bloeddruk, proteïnurie, QTc interval, TTE

### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, vertraagde wondheling/perforatie/fistulisatie, bloeding, hypothyroïdie, artralgie, myalgie, oedeem, proteïnurie
- Gastro-intestinaal: hepatotoxiciteit, transaminitis, diarree, anorexie, nausea en braken, orale mucositis
- Cardiaal: cardiotoxisch, hypertensie, arteriële of veneuze trombo-embolie
- Cutaan: haarontkleuring, hand-voet syndroom, alopecie, huiduitslag
- Myelotoxisch, pulmonale toxiciteit, PRES/RPLS

### Dosisaanpassingen

- Hepatisch gemetaboliseerd.
- Start aan gereduceerde dosis bij matige leverdysfunctie of CYP3A4 inhibitoren